


Mise aux normes des bâtiments porcins

Calculez les volumes produits par type de bâtiment


Une identification correcte de vos stabulations et de la fréquence de nettoyage sont indispensables car elles influencent directement les types et les volumes d'engrais produits.

PORCHERIE SUR CAILLEBOTIS




CAILLEBOTIS			
	Places	m ³ de lisier/place/6 mois	m ³
Truies gestantes		2,4	
Truies avec porcelets		3,6	
Verrats		2,5	
Porcs à l'engrais		0,6	
Porcelets (4 à 10 semaines)		0,2	
			(22)

PORCHERIE PAILLÉE AVEC RÉCOLTE DES URINES



Litière paillée en pente



Litière paillée (paille non accumulée) avec récolte des urines

AIRE PAILLÉE AVEC RÉCOLTE DES URINES					
	Places	m ³ de fumier/place/6 mois	m ³	m ³ de purin/place/6 mois	m ³
Truies gestantes		0,75		0,75	
Truies avec porcelets		1,8		1	
Verrats		0,75		0,75	
Porcs à l'engrais		0,37		0,27	
Porcelets (4 à 10 semaines)		0,27		0,1	
			(23)		(24)

PORCHERIE ENTIÈREMENT PAILLÉE OU SUR LITIÈRE BIOMAÎTRISÉE



Au moins 2 nettoyages par semaine



Moins de 2 nettoyages par semaine

	AIRE PAILLÉE			LITIÈRE BIOMAÎTRISÉE		
	Places	m ³ de fumier/place/6 mois	m ³	Places	m ³ de fumier/place/6 mois	m ³
Truies gestantes		2,7			2,7	
Truies avec porcelets		4,6			4,6	
Verrats		2,7			2,7	
Porcs à l'engrais		0,66			0,66	
Porcelets (4 à 10 semaines)		0,28			0,28	
			(25)			(26)

LÉGENDE

- lisier, purin, eaux brunes
- fumier pouvant être directement stocké au champ
- fumier à stocker sur fumière

Mise aux normes des bâtiments avicoles

Calculez les volumes produits par type de bâtiment

Une identification correcte de vos stabulations est indispensable car elle influence directement les types et les volumes d'engrais produits.

POULAILLER SUR LITIÈRE



Poulailler sur litière




Poulailler sur litière avec parcours extérieure*




Poulailler sur litière, pondoir sur grille

	LITIÈRE			
	Places	m ³ de fumier/ place/ 6 mois	m ³	aire de parcours extérieure bétonnée non couverte*
Poulets de chair (40 jours)		0,015		0,3 m ³ / m ² x m ²
Poules reproductrices (343 jours)		0,0225		
Poules pondeuses (343 jours)		0,027		
Poulettes (127 jours)		0,0225		
Canards (75 jours)		0,06		
Oies (150 jours)		0,06		
Dindes et dindons (85 jours)		0,066		
Pintades (79 jours)		0,0375		
			(28) si MS > 55 %	(30)
			(29) si MS < 55 %	


POULAILLER SUR GRILLES




Fientes séchées M. S. > 55 %



Fientes pré-séchées 35 % < M. S. < 55 %



Fientes humides M. S. < 35 %



Fientes humides

	FIENTES			
	Places	m ³ de fientes/ place/6 mois	m ³	
Poulets de chair (40 jours)		0,021		
Poules reproductrices (343 jours)		0,0225		
Poules pondeuses (343 jours)		0,0345		
Poulettes (127 jours)		0,0225		
Canards (75 jours)		0,027		
Dindes et dindons (85 jours)		0,045		
			(31)	Si stocké sur fumière
			(32)	Si stocké dans une citerne
			(33)	Si fientes séchées (MS > 55 %)

LÉGENDE

- lisier, purin, eaux brunes
- fumier pouvant être directement stocké au champ
- fumier à stocker sur fumière